

## Sedaatiossa tehtävä toimenpide

Pyydämme teitä lukemaan huolellisesti tämän ohjeen.

- Ennen toimenpidettä tulee olla syömättä vähintään 4 tuntia. Viimeksi syömänne aterian tulisi olla kevyt ja helposti sulava.
- Noin 2 tuntia ennen toimenpidettä suositellaan juomaan max. 2 dl sokeripitoista (esim. kirkasta mehua, ilman hedelmälihaa).
- Jos käytätte verenohennuslääkkeitä (mm. Marevan/Aspirin/Disperin/Primaspan/Plavix), keskustelkaa lääkärin kanssa lääkityksestä.
- Ottakaa astmasuihkeet, epilepsialääkkeet ja sepelvaltimotautilääkkeet normaalisti.
- Ottakaa omat lääkkeet ja astmasuihkeet mukaan.
- Pukeutukaa mukaviin, kiristämättömiin vaatteisiin.
- Kotiutuminen 1-3 tuntia toimenpiteestä, sen jälkeen kun lääkäri on antanut reseptit ja kotihoito-ohjeet.
- Oman turvallisuutenne takia teillä tulee olla aikuinen hakija, joka huolehtii paluustanne kotiin ja on saatavilla seuraavaan aamuun saakka.
- Tupakointi on kielletty vähintään toimenpidepäivän ajan.
- Autolla ajaminen ja alkoholin nauttiminen on kielletty seuraavan vuorokauden ajan.
- Mikäli sairastutte, ilmoittakaa siitä vastaanotolle, jolloin selvitetään onko toimenpidettä syytä siirtää.